

پیشگام دامپرور سپاهان

تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان



خوراک طیور

معرفی محصولات طیور

تیم تحقیق و توسعه گروه تولیدی بازرگانی پیشگام دامپرور سپاهان با بهره‌گیری از متخصصین مجرب و با توجه به نیاز تغذیه‌ای و فیزیولوژی در تمام مراحل رشد اقدام به تولید این محصولات متنوع کرده است.

۱ کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۵٪ اپتیمایزد

۲ کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۳/۵٪ نیو

۳ کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۲/۵٪ اپتیمایزد

۴ کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۲/۵٪ سوپر

۵ کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۲/۵٪ پیشگام

۶ کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۵٪ اگ مکس ویژه

۷ خوراک کامل



مزایای کنسانتره های دوقلوی معدنی - ویتامینه

- ✓ افزایش میزان یکنواختی گله و بهینه کردن ضریب تبدیل خوراک
- ✓ تعدیل جمعیت میکروبی و در نتیجه بهبود رشد، تکامل و تندرستی دستگاه گوارش
- ✓ افزایش مقاومت پرنده در برابر بیماری های ویروسی و باکتریایی به دلیل دارا بودن ترکیبات محرک سیستم ایمنی
- ✓ به حداقل رساندن عوارض ناشی از تنش های محیطی خصوصا تنش های سرمایی و گرمایی
- ✓ بالا بودن قابلیت هضم و جذب و ارزش خوراکی به دلیل استفاده از نهاده های با کیفیت بالا
- ✓ امکان تنظیم جیره های متنوع و اقتصادی بر اساس درخواست مرغداران به دلیل وجود آنزیم های اختصاصی در کنسانتره ها
- ✓ به حداقل رساندن اثرات ضد کنشی مواد معدنی بر ویتامین ها به دلیل جدا بودن بخش معدنی و ویتامینه در کنسانتره ها
- ✓ عدم نیاز به افزودن تک ویتامینه یا ماده ی معدنی اضافی به جیره ی خوراکی یا آب آشامیدنی به دلیل وجود مکمل های ویژه پیشگام در همه کنسانتره ها

کنسانتره های دوقلوی

معدنی-ویتامینه

Mineral-Vitamin
Concentrate



کنسانتره ترکیبی از مواد مغذی اصلی و موردنیاز طیور شامل انواع ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و افزودنی های خوراک می باشد از آنجائیکه پایداری و متعاقب آن قابلیت دسترسی ویتامین ها توسط سایر اجزایی که در پیش مخلوط ها وجود دارند (مواد معدنی، کولین کلراید و ...) تحت تاثیر قرار می گیرد، گروه تولیدی بازرگانی پیشگام دامپرور سپاهان برای اولین بار در ایران اقدام به تولید انواع کنسانتره های دوقلوی معدنی - ویتامینه مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار نموده تا از اثرات ضد کنشی مواد معدنی بر ویتامین ها تا حد امکان جلوگیری شود.

5% Optimized Mineral-Vitamin Concentrate

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره دوقلوی ۵ درصد اپتیمایزد (Optimized)

مقادیر	واحد	ماده مغذی
۵ ± ۱	درصد	رطوبت
۱۲۰۰	کیلوکالری در کیلوگرم	انرژی قابل سوخت و ساز (ME _N)
۸/۵ ± ۱	درصد	پروتیین
۲/۲ ± ۰/۲	درصد	لیزین
۳/۲ ± ۰/۲	درصد	متیونین+سیستین
۰/۸ ± ۰/۱	درصد	ترئونین
۱۱ ± ۱/۵	درصد	کلسیم
۴/۲ ± ۰/۵	درصد	فسفر
۶	درصد	فسفر قابل دسترس*
۱/۷۵ ± ۰/۲۵	درصد	سدیم

*میزان فسفر در دسترس با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز بیان شده است.

اجزاء تشکیل دهنده کنسانتره: ذرت، سیوس گندم، دی-ال متیونین، ال-لیزین، ال-ترئونین، کولین کلراید، کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، نمک، جوش شیرین، سولفات سدیم، مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، فیتاز، مولتی آنزیم و دیگر افزودنی های خوراکی مجاز.



کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۵٪ اپتیمایزد

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی تامین شده توسط کنسانتره دوقلوی ۵ درصد اپتیمایزد (Optimized)

ویتامین ها و مواد معدنی	واحد	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم کنسانتره	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم خوراک
ویتامین A	واحد بین المللی	۳۴۲۰۰۰	۸۵۵۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۱۷۱۰۰۰	۴۲۷۵
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۷۱۰	۴۲
ویتامین K3	میلی گرم	۱۱۴	۲/۸۵
ویتامین B1	میلی گرم	۱۱۴	۲/۸۵
ویتامین B2	میلی گرم	۲۲۸	۵/۷
پانتوتینیک اسید	میلی گرم	۵۷۰	۱۴
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۲۲۸۰	۵۷
ویتامین B6	میلی گرم	۲۰۰	۵
ویتامین B9	میلی گرم	۸۰	۲
ویتامین B12	میلی گرم	۰/۵۷	۰/۰۱۴
بیوتین H2	میلی گرم	۱۲	۰/۳
منگنز	میلی گرم	۵۰۰۰	۱۲۵
روی	میلی گرم	۴۸۰۰	۱۲۰
آهن	میلی گرم	۸۰۰	۲۰
مس	میلی گرم	۶۴۰	۱۶
ید	میلی گرم	۵۰	۱/۲۵
سلنیوم	میلی گرم	۱۲	۰/۳

5% Optimized Mineral-Vitamin Concentrate

کنسانتره معدنی - ویتامینه ۵٪ اپتیمایزد

جیره های پیشنهادی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای جوجه های گوشتی سویه راس در دوره های مختلف پرورش با استفاده از کنسانتره ۵ درصد دوقلوی معدنی - ویتامینه اپتیمایزد (Optimized)

- در تنظیم فسفر قابل دسترس جیره ها، تاثیر گذاری آنزیم فیتاز موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است.
- چنانچه به جای کربنات کلسیم، از پودر صدف (حاوی سنگریزه بالا) در جیره ها استفاده می شود لازم است که به جای هر کیلوگرم کربنات ۱/۲۵ کیلوگرم پودر صدف مصرف گردد.
- در صورت تعادل به استفاده از مواد خوراکی غیر متداول برای دریافت جیره ی غذایی موردنظر و اخذ مشاوره های تخصصی با بخش علمی شرکت پیشگام دامپرور سپاهان تماس حاصل فرمایید.



اجزای جیره خوراکی (کیلوگرم)	۱-۷ روزگی	۸-۱۴ روزگی	۱۵-۲۸ روزگی	۲۹-۳۹ روزگی	۴۰-۴۶ روزگی	۴۷ روزگی تا کشتار
ذرت	۵۳۵	۵۴۰	۵۶۶/۶	۶۴۱/۵	۶۶۴/۵	۶۹۰/۵
کنجاله سویا	۳۸۵	۳۸۰	۳۶۰	۲۹۰	۲۷۰	۲۴۵
کنسانتره معدنی	۳۲/۵	۳۲	۲۸	۲۵	۲۳	۲۱
کنسانتره ویتامینه	۳۲/۵	۳۲	۲۸	۲۵	۲۳	۲۱
نمک	۰/۴	۰/۳	۰/۷	۱	۱	۱
کربنات کلسیم	۴/۶	۳/۷	۴/۷	۵/۵	۵/۵	۵/۵
روغن	۱۰	۱۲	۱۲	۱۲	۱۳	۱۶

مواد مغذی	مقادیر محاسبه شده					
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۸۳۰	۲۸۵۰	۲۸۸۵	۲۹۷۰	۳۰۱۰	۳۰۶۰
پروتئین خام (%)	۲۱/۸	۲۱/۶	۲۰/۹	۱۸/۳	۱۷/۶	۱۶/۷
لیزین (%)	۱/۲۸	۱/۲۶۷	۱/۲۰۶	۱/۰۲	۰/۹۶۶	۰/۸۹۹
متیونین + سیستین (%)	۰/۸۵۷	۰/۸۴۹	۰/۸۰۹	۰/۷۲۶	۰/۶۹۷	۰/۶۶۳
ترئونین (%)	۰/۸۶۸	۰/۸۵۹	۰/۸۲۷	۰/۷۱۹	۰/۶۸۹	۰/۶۵
کلسیم (%)	۱	۰/۹۶	۰/۹	۰/۸۵	۰/۸۰	۰/۷۵
فسفر قابل دسترس (%)	۰/۴۹	۰/۴۸۸	۰/۴۵۴	۰/۴۲۲	۰/۴۰۳	۰/۳۸۴
سدیم (%)	۰/۱۵۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۴۵	۰/۱۴

3.5% New Mineral-Vitamin Concentrate

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره دوقلوی ۳/۵ درصد نیو (New)

ماده مغذی	واحد	مقادیر
انرژی قابل سوخت و ساز (ME _N)	کیلوکالری در کیلوگرم	۷۴۰
پروتئین خام	درصد	۱۰/۵ ± ۱
کلسیم	درصد	۱۱/۷۰ ± ۱
فسفر	درصد	۵/۱۵ ± ۰/۵
فسفر قابل دسترس *	درصد	۷/۵ ± ۰/۵
سدیم	درصد	۱/۸۰
متیونین+سیستین	درصد	۵/۷۵
لیزین	درصد	۲/۸۵
ترئونین	درصد	۱/۱۸

* میزان فسفر قابل دسترس با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز بیان شده است.

اجزاء تشکیل دهنده کنسانتره: سبوس گندم، دی-ال متیونین، ال-لیزین، ال-ترئونین، مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، نمک، فیتاز، مولتی آنزیم و دیگر افزودنی‌های مجاز.



کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۳/۵٪ نیو

آنالیز ویتامین‌ها و مواد معدنی تامین شده توسط کنسانتره دوقلوی ۳/۵ درصد نیو (New)

ویتامین‌ها و مواد معدنی	واحد	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم کنسانتره
ویتامین A	واحد بین المللی	۴۵۰۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۲۲۵۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۲۲۵۰
ویتامین K3	میلی گرم	۱۵۰
ویتامین B1	میلی گرم	۱۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۳۰۰
پانتوتیک اسید	میلی گرم	۷۵۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۳۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۱۵۰
ویتامین B9	میلی گرم	۸۸
ویتامین B12	میلی گرم	۰/۷۵
بیوتین H2	میلی گرم	۷/۵
منگنز	میلی گرم	۶۲۵۰
روی	میلی گرم	۶۰۰۰
آهن	میلی گرم	۱۰۰۰
مس	میلی گرم	۸۰۰
ید	میلی گرم	۶۲
سلنیوم	میلی گرم	۱۵

3.5% New Mineral-Vitamin Concentrate

کنسانتره معدنی - ویتامینه ۵/۳% نیو

جیره های پیشنهادی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای جوجه های گوشتی سویه راس در دوره های مختلف پرورش با استفاده از کنسانتره ۵/۳ درصد دوقلوی معدنی - ویتامینه نیو (New)

- در تنظیم فسفر قابل دسترس جیره ها، تاثیر گذاری آنزیم فیتاز موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است.
- چنانچه به جای کربنات کلسیم، از پودر صدف (حاوی سنگریزه بالا) در جیره ها استفاده می شود لازم است که به جای هر کیلوگرم کربنات، ۱/۲۵ کیلوگرم پودر صدف مصرف گردد.
- در صورت تعایل به استفاده از مواد خوراکی غیر متداول برای دریافت جیره ی غذایی موردنظر و اخذ مشاوره های تخصصی با بخش علمی شرکت پیشگام دامپرو سپاهان تماس حاصل فرمایید.



۴۳ روزگی تا کشتار	۳۶-۴۲ روزگی	۲۹-۳۵ روزگی	۲۱-۲۸ روزگی	۱۱-۲۰ روزگی	۱-۱۰ روزگی	اجزای جیره خوراکی (کیلوگرم)
۷۰۲	۶۷۴	۶۳۱	۶۱۷	۵۸۴	۵۵۲	ذرت
۲۴۵	۲۷۰	۳۰۸	۳۲۰	۳۵۰	۳۸۰	کنجاله سویا
۱۵	۱۶/۵	۱۹	۲۰	۲۳	۲۵	کنسانتره معدنی
۱۵	۱۶/۵	۱۹	۲۰	۲۳	۲۵	کنسانتره ویتامینه
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۲	۱۰	روغن
۸/۵	۸/۵	۸/۵	۸/۶	۷	۷	کربنات کلسیم
۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۴	۱	۱	نمک

مقادیر محاسبه شده						مواد مغذی
۳۰۴۰	۳۰۱۰	۲۹۶۰	۲۹۳۵	۲۸۹۰	۲۸۳۰	انرژی قابل سوخت و ساز
۱۶/۷	۱۸/۰	۱۹/۰	۱۹/۵	۲۰/۵	۲۱/۷	پروتئین خام (%)
۰/۹۰	۰/۹۶	۱/۰۷	۱/۱۰	۱/۲۰	۱/۲۷	لیزین (%)
۰/۷۱	۰/۷۵	۰/۸۱	۰/۸۴	۰/۹۰	۰/۹۴	متیونین + سیستین (%)
۰/۶۶	۰/۷۰	۰/۷۶	۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۸۷	ترئونین (%)
۰/۷۵	۰/۷۸	۰/۸۵	۰/۸۷	۰/۹۰	۰/۹۶	کلسیم (%)
۰/۳۳	۰/۳۵	۰/۳۹	۰/۴۱	۰/۴۵	۰/۴۸	فسفر قابل دسترس (%)
۰/۱۴	۰/۱۴۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵۵	سدیم (%)

2.5% Optimized Mineral-Vitamin Concentrate

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره دوقلوی ۲/۵ درصد اپتیمایزد (Optimized)

مقادیر	واحد	ماده مغذی
۷۵۰	کیلوکالری در کیلوگرم	انرژی قابل سوخت و ساز (ME _N)
۱۰ ± ۱	درصد	پروتیین خام
۱۶ ± ۱/۵	درصد	کلسیم
۸ ± ۱	درصد	فسفر
۱۲	درصد	فسفر قابل دسترس *
۳/۵۰ ± ۰/۵	درصد	سدیم
۶	درصد	متیونین + سیستین
۴	درصد	لیزین
۱/۲	درصد	ترئونین

* میزان فسفر در دسترس با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز بیان شده است.

اجزاء تشکیل دهنده کنسانتره: دی-ال متیونین، ال-لیزین، ال-ترئونین مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، کلسیم فسفات، کرنات کلسیم، نمک، فیتاز، مولتی آنزیم و دیگر افزودنی های خوراکی مجاز.

کنسانتره معدنی - ویتامینه ۲/۵٪ اپتیمایزد

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی تامین شده توسط کنسانتره دوقلوی ۲/۵ درصد اپتیمایزد (Optimized)

ویتامین ها و مواد معدنی	واحد	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم کنسانتره
ویتامین A	واحد بین العلی	۶۸۴۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین العلی	۳۴۲۰۰۰
ویتامین E	واحد بین العلی	۳۴۲۰
ویتامین K3	میلی گرم	۲۲۸
ویتامین B1	میلی گرم	۱۵۲
ویتامین B2	میلی گرم	۴۵۶
پانتوتینیک اسید	میلی گرم	۱۱۴۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۴۵۶۰
ویتامین B6	میلی گرم	۲۲۸
ویتامین B9	میلی گرم	۱۳۳
ویتامین B12	میلی گرم	۱/۱۴
بیوتین H2	میلی گرم	۱۱/۴
منگنز	میلی گرم	۱۰۰۰۰
روی	میلی گرم	۹۶۰۰
آهن	میلی گرم	۱۶۰۰
مس	میلی گرم	۱۲۸۰
ید	میلی گرم	۱۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۴

2.5% Optimized Mineral-Vitamin Concentrate

کنسانتره معدنی - ویتامینه ۲/۵٪ اپتیمایزد

جیره های پیشنهادی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای جوجه های گوشتی سویه راس در دوره های مختلف پرورش با استفاده از کنسانتره ۲/۵ درصد دوقلوی معدنی - ویتامینه اپتیمایزد (Optimized)

- در تنظیم فسفر قابل دسترس جیره ها، تاثیر گذاری آنزیم فیتاز موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است.
- چنانچه به جای کربنات کلسیم، از پودر صدف (حاوی سنگریزه بالا) در جیره ها استفاده می شود لازم است که به جای هر کیلوگرم کربنات ۱/۲۵ کیلوگرم پودر صدف مصرف گردد.
- در صورت تعادل به استفاده از مواد خوراکی غیر متداول برای دریافت جیره ی غذایی موردنظر و اخذ مشاوره های تخصصی با بخش علمی شرکت پیشگام دامپرو سپاهان تماس حاصل فرمایید.



اجزای جیره خوراکي (کیلوگرم)	۱-۷ روزگی	۸-۱۴ روزگی	۱۵-۲۸ روزگی	۲۹-۳۹ روزگی	۴۰-۴۶ روزگی	۴۷ روزگی تا کشتار
ذرت	۵۵۶/۸	۵۶۸/۶	۵۹۱/۷	۶۶۴	۶۸۶/۴	۷۱۰/۲
کنجاله سویا	۳۹۰	۳۸۰	۳۶۰	۲۹۰	۲۷۰	۲۴۵
روغن گیاهی	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳
کنسانتره معدنی	۱۷	۱۶	۱۴	۱۲/۵	۱۱/۵	۱۱
کنسانتره ویتامینه	۱۷	۱۶	۱۴	۱۲/۵	۱۱/۵	۱۱
کربنات کلسیم	۹	۹	۹/۶	۱۰	۹/۶	۸/۸
نمک	۰/۲	۰/۴	۰/۷	۱	۱	۱

مواد مغذی	مقادیر محاسبه شده					
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۸۵۰	۲۸۶۰	۲۹۰۰	۲۹۸۰	۳۰۱۰	۳۰۶۰
پروتئین خام (%)	۲۲	۲۱/۷	۲۱	۱۸/۳	۱۷/۶	۱۶/۷
لیزین (%)	۱/۳۰	۱/۲۷	۱/۲۰	۱/۰۲	۰/۹۷	۰/۹۰
متیونین + سیستین (%)	۰/۸۷	۰/۸۵	۰/۸۱	۰/۷۳	۰/۷۰	۰/۶۷
ترئونین (%)	۰/۸۸	۰/۸۶	۰/۸۳	۰/۷۲	۰/۶۹	۰/۶۵
کلسیم (%)	۱	۰/۹۶	۰/۹۰	۰/۸۵	۰/۸۰	۰/۷۵
فسفر قابل دسترس (%)	۰/۵۰	۰/۴۸	۰/۴۵	۰/۴۲	۰/۴۰	۰/۳۹
سدیم (%)	۰/۱۵۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۴۵	۰/۱۴



2.5% Super Mineral-Vitamin Concentrate

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره دوقلوی ۲/۵ درصد سوپر (Super)

مقادیر	واحد	ماده مغذی
۶۵۰	کیلوکالری در کیلوگرم	انرژی قابل سوخت و ساز (ME _N)
۱۰ ± ۰/۵	درصد	پروتئین خام
۴/۵۰	درصد	لیزین
۸/۵۰	درصد	متیونین+سیستین
۱	درصد	ترئونین
۱۶	درصد	کلسیم
۱۳ ± ۱	درصد	فسفر قابل دسترس *
۱/۶۸	درصد	سدیم

* میزان فسفر در دسترس با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز بیان شده است.

اجزاء تشکیل دهنده کنسانتره: سبوس گندم، دی-ال متیونین، ال-لیزین، ال-ترئونین، کولین کلراید، مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، نمک، سولفات سدیم، جوش شیرین، فیتاز، مولتی آنزیم و دیگر افزودنی های خوراکی مجاز.



کنسانتره معدنی - ویتامینه ۲/۵٪ سوپر

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی تامین شده توسط کنسانتره دوقلوی ۲/۵ درصد سوپر (Super)

ویتامین ها و مواد معدنی	واحد	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم کنسانتره	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم خوراک
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۴۸۰۰۰۰	۶۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۴۸۰۰	۶۰
ویتامین K3	میلی گرم	۲۵۶	۳/۲
ویتامین B1	میلی گرم	۲۵۶	۳/۲
ویتامین B2	میلی گرم	۶۸۸	۸/۶
پانتوتینیک اسید	میلی گرم	۱۶۰۰	۲۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۵۲۰۰	۶۵
ویتامین B6	میلی گرم	۴۳۲	۵/۴
ویتامین B9	میلی گرم	۱۷۶	۲/۲
ویتامین B12	میلی گرم	۱/۴۴	۰/۰۱۸
بیوتین H2	میلی گرم	۲۴	۰/۳
منگنز	میلی گرم	۹۶۰۰	۱۲۰
روی	میلی گرم	۹۶۰۰	۱۲۰
آهن	میلی گرم	۳۲۰۰	۴۰
مس	میلی گرم	۱۴۸۰	۱۸/۵
ید	میلی گرم	۱۰۰	۱/۲۵
سلنیوم	میلی گرم	۲۴	۰/۳۰

2.5% Super Mineral-Vitamin Concentrate

کنسانتره معدنی - ویتامینه ۲/۵ سوپر

جیره های پیشنهادی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای جوجه های گوشتی سویه راس در دوره های مختلف پرورش با استفاده از کنسانتره ۲/۵ درصد دوقلوی معدنی - ویتامینه سوپر (Super)

- در تنظیم فسفر قابل دسترس جیره ها، تاثیر گذاری آنزیم فیتاز موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است.
- چنانچه به جای کربنات کلسیم، از پودر صدف (حاوی سنگریزه بالا) در جیره ها استفاده می شود لازم است که به جای هر کیلوگرم کربنات، ۱/۲۵ کیلوگرم پودر صدف مصرف گردد.
- در صورت تمایل به استفاده از مواد خوراکی غیر متداول برای دریافت جیره ی غذایی موردنظر و اخذ مشاوره های تخصصی با بخش علمی شرکت پیشگام دامپرور سپاهان تماس حاصل فرمایید.



اجزای جیره خوراکی (کیلوگرم)	۱-۱۰ روزگی	۱۱-۲۸ روزگی	۲۹-۳۹ روزگی	۴۰-۴۶ روزگی	۴۷ روزگی تا کشتار
ذرت	۵۶۸/۵	۵۹۷	۶۵۸	۶۹۹	۷۱۶
کنجاله سویا	۳۸۰	۳۵۵	۲۹۵	۲۵۰	۲۳۵
روغن	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳	۱۶
کنسانتره معدنی	۱۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۰
کنسانتره ویتامینه	۱۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۰
کربنات کلسیم	۹/۲	۱۰/۹	۱۰	۱۰/۸	۱۰/۶
نمک	۲	۲/۱	۲	۲/۲	۲/۴

مواد مغذی	مقادیر محاسبه شده				
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۸۷۰	۲۹۱۰	۲۹۸۰	۳۰۵۰	۳۰۹۰
پروتئین خام (%)	۲۲	۲۱	۱۸/۸	۱۷	۱۶/۵
لیزین (%)	۱/۳۰	۱/۲۱	۱/۰۶	۰/۹۵	۰/۹۰
متیونین + سیستین (%)	۰/۹۳	۰/۸۷	۰/۸۱	۰/۷۶	۰/۷۱
ترئونین (%)	۰/۸۵	۰/۸۰	۰/۷۱	۰/۶۵	۰/۶۴
کلسیم (%)	۰/۹۵	۰/۹۰	۰/۸۷	۰/۸۷	۰/۸۰
فسفر قابل دسترس (%)	۰/۵۱	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۴	۰/۳۷
سدیم (%)	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵

Pishgam 2.5% Mineral-Vitamin Concentrate

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره دوقلوی ۲/۵ درصد پیشگام (Pishgam)

مقادیر	واحد	ماده مغذی
۷۰۰	درصد	انرژی قابل سوخت و ساز (MEN)
۱۰ ± ۰/۵	کیلوکالری در کیلوگرم	پروتئین خام
۴/۵۰	درصد	لیزین
۷	درصد	متیونین + سیستین
۱	درصد	ترئونین
۱۶	درصد	کلسیم
۱۲/۱	درصد	فسفر قابل دسترس*
۳/۷	درصد	سدیم

*میزان فسفر در دسترس با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز بیان شده است.

اجزاء تشکیل دهنده کنسانتره: سبوس گندم، دی-ال متیونین، ال-لیزین، ال-ترئونین، کولین کلراید، مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، نمک، سولفات سدیم، جوش شیرین، فیتاز، مولتی آنزیم و دیگر افزودنی های خوراکی مجاز.



کنسانتره معدنی - ویتامینه ۲/۵٪ پیشگام

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی تامین شده توسط کنسانتره دوقلوی ۲/۵ درصد پیشگام (Pishgam)

ویتامین ها و مواد معدنی	واحد	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم کنسانتره	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم خوراک
ویتامین A	واحد بین المللی	۹۹۶۰۰۰	۱۲۴۵۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳۹۸۴۰۰	۴۹۸۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۴۰۰۰	۵۰
ویتامین K3	میلی گرم	۲۱۲	۲/۶۶
ویتامین B1	میلی گرم	۲۱۲	۲/۶۶
ویتامین B2	میلی گرم	۵۷۱	۷/۲
پانتوتینیک اسید	میلی گرم	۱۳۲۸	۱۶/۶
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۴۳۱۶	۵۴
ویتامین B6	میلی گرم	۳۵۸	۴/۵
ویتامین B9	میلی گرم	۱۴۶	۱/۸۳
ویتامین B12	میلی گرم	۱/۲	۰/۰۱۵
بیوتین H2	میلی گرم	۲۰	۰/۲۵
منگنز	میلی گرم	۷۹۶۸	۱۰۰
روی	میلی گرم	۷۹۶۸	۱۰۰
آهن	میلی گرم	۲۶۵۶	۳۳
مس	میلی گرم	۱۲۲۸	۱۵/۴
ید	میلی گرم	۸۳	۱/۰۴
سلنیوم	میلی گرم	۲۰	۰/۲۵

Pishgam 2.5% Mineral-Vitamin Concentrate

کنسانتره معدنی - ویتامینه ۲/۵٪ پیشگام

جیره های پیشنهادی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای جوجه های گوشتی سویه راس در دوره های مختلف پرورش با استفاده از کنسانتره ۲/۵ درصد دوقلوی معدنی - ویتامینه پیشگام (Pishgam)

- در تنظیم فسفر قابل دسترس جیره ها، تاثیر گذاری آنزیم فیتاز موجود در کنسانتره نیز در نظر گرفته شده است.
- چنانچه به جای کربنات کلسیم، از پودر صدف (حاوی سنگریزه بالا) در جیره ها استفاده می شود لازم است که به جای هر کیلوگرم کربنات، ۱/۲۵ کیلوگرم پودر صدف مصرف گردد.
- در صورت تعادل به استفاده از مواد خوراکی غیر متداول برای دریافت جیره ی غذایی موردنظر و اخذ مشاوره های تخصصی با بخش علمی شرکت پیشگام دامپرور سپاهان تعاس حاصل فرمایید.



اجزای جیره خوراکی (کیلوگرم)	۱-۱۰ روزگی	۱۱-۲۸ روزگی	۲۹-۳۹ روزگی	۴۰-۴۶ روزگی	۴۷ روزگی تا کشتار
ذرت	۵۷۲/۵	۶۰۹	۶۷۴/۴	۷۱۰	۷۲۲/۳
کنجاله سویا	۳۸۰	۳۴۵	۲۸۰	۲۴۵	۲۳۰
روغن	۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۶
کنسانتره معدنی	۱۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۰
کنسانتره ویتامینه	۱۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۰
کربنات کلسیم	۹/۱	۱۰/۲	۹/۸	۹/۲	۱۰/۴
نمک	۰/۴	۰/۸	۰/۸	۰/۸	۱/۳

مواد مغذی	مقادیر محاسبه شده				
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۸۷۰	۲۹۳۰	۳۰۰۰	۳۰۴۰	۳۱۰۰
پروتئین خام (%)	۲۲	۲۰/۷	۱۸/۵	۱۷	۱۶/۵
لیزین (%)	۱/۲۹	۱/۱۹	۱/۰۳	۰/۹۴	۰/۸۸
متیونین + سیستین (%)	۰/۸۹	۰/۸۲	۰/۷۶	۰/۷۲	۰/۶۷
ترئونین (%)	۰/۸۷	۰/۸۱	۰/۷۲	۰/۶۶	۰/۶۴
کلسیم (%)	۰/۹۵	۰/۹۰	۰/۸۷	۰/۸۳	۰/۸۰
فسفر قابل دسترس (%)	۰/۴۹	۰/۴۳	۰/۴۲	۰/۴۱	۰/۳۵
سدیم (%)	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵

5% Special Egg Max Mineral-Vitamin Concentrate

کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۵٪ اگ مکس ویژه

مزایای استفاده از کنسانتره دوقلوی ۵ درصد اگ مکس ویژه

- ✓ افزایش طول عمر اقتصادی گله.
- ✓ دستیابی به پیک تولید بالا با حفظ حداکثر ماندگاری آن.
- ✓ افزایش یکنواختی توزیع خوراک و بهینه کردن ضریب تبدیل غذایی.
- ✓ بهبود کیفیت پوسته و کاهش درصد تخم مرغ های شکسته و معیوب.
- ✓ دست یابی به گله ای با یکنواختی بالا در پایان دوره پرورش و طول دوره تخم گذاری.
- ✓ کاهش احتمال بروز عارضه خودخوری در طی دوره پرورش و قفس رنجوری در طی دوره تخم گذاری.
- ✓ جلوگیری از اثرات ضد کنشی بخش معدنی و ویتامینه کنسانتره به علت جدا بودن آنها از یکدیگر تا قبل از مصرف.
- ✓ عدم نیاز به افزودن تک ویتامینه یا ماده معدنی اضافی به جیره غذایی و یا آب آشامیدنی به دلیل استفاده از مکمل ویژه در کنسانتره

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره دوقلوی ۵ درصد اگ مکس ویژه (Special Egg Max)

ماده مغذی	واحد	ویژه دوره پرورش	ویژه دوره پیک تولید	ویژه دوره بعد از پیک تولید
انرژی قابل سوخت و ساز (ME _N)	کیلوکالری در کیلوگرم	۱۱۰۰	۸۰۰	۱۱۰۰
پروتئین خام	درصد	۱۰	۵	۵
لیزین	درصد	۱/۶	۰/۶۰	۰/۴۵
متیونین + سیستین	درصد	۳	۳/۳	۲/۹
ترئونین	درصد	۰/۷	۰	۰
فسفر	درصد	۴	۶/۶	۵/۶
فسفر قابل دسترس*	درصد	۶	-	-
کلسیم	درصد	۹	۱۲	۱۱/۵
سدیم	درصد	۱/۸	۱/۷	۱/۸۸
کلر	درصد	۳/۲	۱/۹	۱/۸۶

*میزان فسفر در دسترس با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز بیان شده است.



5% Special Egg Max Mineral-Vitamin Concentrate

کنسانتره معدنی _ ویتامینه ۵٪ اگ مکس ویژه

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی تامین شده توسط کنسانتره ۵ درصد دوقلوی معدنی _ ویتامینه اگ مکس ویژه (Special Egg Max)

ویتامین ها و مواد معدنی	واحد	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم خوراک (دوره پیک تولید)	مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم خوراک (دوره پس از پیک تولید)
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۲۰۰۰	۲۵۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۲۵	۲۰
ویتامین K3	میلی گرم	۳	۳
ویتامین B1	میلی گرم	۱	۱
ویتامین B2	میلی گرم	۶	۴
پانتوتنیک اسید	میلی گرم	۸	۸
نیاسین	میلی گرم	۳۰	۳۰
ویتامین B6	میلی گرم	۳	۳
ویتامین B9	میلی گرم	۱	۰/۵
ویتامین B12	میلی گرم	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵
بیوتین H2	میلی گرم	۰/۰۵	۰/۰۲۵
کولین	میلی گرم	۳۰۰	۴۰۰
روی	میلی گرم	۶۰	۶۰
مس	میلی گرم	۵	۵
منگنز	میلی گرم	۱۰۰	۱۰۰
آهن	میلی گرم	۲۵	۲۵
ید	میلی گرم	۰/۵	۰/۵
سلیوم	میلی گرم	۰/۲	۰/۲
کبالت	میلی گرم	۰/۱	۰/۱

Complete Feed

خوراک کامل

به طور کلی نوع خوراک از نظر شکل فیزیکی در میزان مصرف خوراک و عملکرد نهایی طیور تاثیر بسزایی دارد. اصولا خوراک کامل باید دارای تمام مواد مغذی مورد نیاز طیور شامل ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، و ... باشد.



مزایای استفاده از خوراک کامل

- ✓ بهبود کیفیت بستر.
- ✓ بهبود ضریب تبدیل خوراک.
- ✓ افزایش میزان یکنواختی گله.
- ✓ کاهش میزان اتلاف خوراک به هنگام مصرف.
- ✓ ارزش غذایی بالا به دلیل وجود آنزیم های غذایی.
- ✓ بهبود انسجام سلول های روده و پیشگیری از ناهنجاری های گوارشی.
- ✓ معانعت از بروز مسمومیت های قارچی به علت وجود توکسین بایندر چند جزیی.

- ✓ بهبود سرعت رشد و میزان اضافه وزن گله به دلیل دارا بودن مواد محرک رشد.
- ✓ تعدیل جمعیت میکروبی و در نتیجه بهبود رشد، تکامل و سلامت دستگاه گوارش.
- ✓ تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت گله در برابر عوامل باکتریایی، ویروسی و انگلی.
- ✓ کیفیت پروتئینی و آمینو اسیدی مناسب به سبب استفاده از مواد خوراکی با قابلیت هضم بالا.
- ✓ افزایش سطح جذب روده و بهبود کارایی دستگاه گوارش به دلیل استفاده از مواد محرک رشد.

Complete Feed

خوراک کامل

آنالیز مواد مغذی موجود در خوراک کامل جوجه های گوشتی (راس ۳.۸) جهت دوره های مختلف پرورش

خوراک پایانی ۲	خوراک پایانی ۱	خوراک میان دان	خوراک پیش دان	خوراک آغازین	واحد	ماده مغذی
۳۰۳۰	۳۰۰۰	۲۹۸۰	۲۹۵۰	۲۸۵۰	کیلوکالری در کیلوگرم	انرژی قابل سوخت و ساز (ME _N)
۱۶	۱۸/۵	۱۹	۲۰/۵	۲۱/۵	درصد	پروتئین خام
۰/۹۵	۱/۱	۱/۱۲	۱/۲۲	۱/۳۴	درصد	لیزین
۰/۷۶	۰/۸۶	۰/۸۸	۰/۹۵	۱/۰۲	درصد	متیونین + سیستین
۰/۶۶	۰/۷۵	۰/۷۶	۰/۸۵	۰/۹	درصد	ترئونین
۰/۷۲	۰/۷۸	۰/۸۷	۰/۹	۰/۹۶	درصد	کلسیم
۰/۴۸	۰/۵۲	۰/۵۱	۰/۵۶	۰/۵۹	درصد	فسفر کل
۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	درصد	سدیم

سرانه مصرف خوراک آغازین: برای دستیابی به عملکرد مطلوب توصیه می گردد که حدود ۱۵۰-۱۳۰ گرم خوراک در طی ۷ روز اول دوره پرورش مورد مصرف قرار گیرد.

سرانه مصرف خوراک پیش دان: پیشنهاد میگردد که حدود ۸۵۰-۷۰۰ گرم خوراک از ۸ تا ۲۰ روزگی مورد مصرف قرار گیرد.

سرانه مصرف خوراک میان دان: جهت دستیابی به عملکرد مناسب پیشنهاد می شود که حدود ۲۰۰۰-۱۷۰۰ گرم خوراک از ۲۱ تا ۳۵ روزگی مورد مصرف قرار گیرد.

سرانه مصرف خوراک پایانی ۱: پیشنهاد می شود که حدود ۱۲۰۰-۱۱۰۰ گرم خوراک از ۳۶ تا ۴۲ روزگی مورد مصرف قرار گیرد.

سرانه مصرف خوراک پایانی ۲: در این خصوص باتوجه به وزن هدف بایستی تصمیم گیری نمود.



نشانی کارخانه شماره یک :

جاده اصفهان شهرضا، ۲ کیلومتر مانده به
شهرضا شهرک صنعتی سپهر آباد نبش
خیابان هشتم، کارخانه پیشگام
دامپور سپاهان

نشانی کارخانه شماره دو :

جاده اصفهان شهرضا ، شهرک صنعتی
رازی، فاز ۳، بلوار توسعه، فرعی یک، کارخانه
پیشگام دامپور سپاهان



دفتر مرکزی :

اصفهان ، چهارراه آپادانا خیابان ۱۵ خرداد،
روبروی اداره کل بهزیستی، پلاک ۱۲۸



۰۳۱۳۶۴۱۳۶۳۴

۰۳۱۳۶۴۱۳۲۷۵

pishgamds.com
 [pishgamds](https://www.instagram.com/pishgamds)

